



动	扣 2 分（最多扣 6 分）。
---	-----------------

部放于按压部位，另一手平行重叠于该手手背上，手指并拢，以掌根部接触按压部

6

位置靠左、右、上、下均扣 1 分，一次不定位扣 1 分，定位方法不正确扣 1 分。

4

定位

位，双髻位于患者胸骨的正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直下压。

分钟至少 100 次，

按压不松手扣 1 分，一次不放手扣 1 分，按压频率每分钟至少 100 次。

按压速率每

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------

6	（）	扣 2 分，按压频率每分钟至少 100 次。
---	----	------------------------